



ないそく はんげつばん こうこん だんれつ

内側半月板後根断裂

—あなたのその危険な半月板損傷、見逃していませんか？—

内側半月板後根断裂(ないそくはんげつばん こうこんだんれつ)は、中高年(50～60歳台)の女性に好発し、急激に膝関節の機能が悪化する特殊な半月板の断裂です。しかし、適切な診療がなされず、**膝関節骨壊死**や**変形性膝関節症**が進行した状態となり、人工膝関節手術を余儀なくされる症例が多く認められます。

内側半月板後根断裂はこうして発生します



階段の利用、ハイキング、犬の散歩、段差や溝を飛び越える際の着地で受傷することが多いようです。パキッという音とともに膝の裏側の痛みを自覚した場合は、すぐに専門医に相談しましょう。MRI検査による診断が必要です。

特徴的なMRI画像所見

Furumatsu et al. J Orthop Sci. 2017

①裂け目サイン




後根の連続性が消失

②幽霊サイン



後方陰影の欠損


③キリンの首サイン



半月板の腫大

手術治療 (岡山大学病院 膝関節グループ)

膝関節鏡を用いた半月板修復術： 適応症例には早期の手術が勧められます。



Fujii, Furumatsu et al. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017